肝硬化时血清神经肽 Y 与透明质酸和前胶原蛋白 III 水平变化及临床意义

孙 刚(江苏省连云港市妇幼保健院检验科 222006)

【摘要】 目的 探讨肝硬化患者血清神经肽 Y(NPY)、透明质酸(HA)和前胶原蛋白 III(PⅢP)水平的变化及临床意义。**方法** 应用放射免疫分析法检测 66 例肝硬化患者血清 NPY、HA 和 PⅢP 水平,并与 35 例健康对照组作比较。**结果** 肝硬化患者血清 NPY 水平显著低于健康对照组,差异有统计学意义($P < 0.01$);而 HA 和 PⅢP 水平显著高于健康对照组,且 NPY 与 HA、PⅢP 呈明显负相关,差异有统计学意义($r = -0.968 6$ 、 $-0.955 3$, $P < 0.01$)。**结论** 检测肝硬化患者血清 NPY、HA 和 PⅢP 水平变化,对了解病情和判断愈后有十分重要的临床价值。

【关键词】 肝硬化; 神经肽 Y; 透明质酸; 前胶原蛋白 III

DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2011.17.014 文献标志码:A 文章编号:1672-9455(2011)17-2078-02

Clinical value and measurement of serum NPY, HA and PⅢP in patients with liver cirrhosis SUN Gang (Department of Clinical Laboratory, Lianyungang Women and Children Health Hospital, Lianyungang, Jiangsu 222006, China)

【Abstract】 Objective To investigate the levels of serum neuropeptide Y (NPY) and hyaluronic acid(HA) and procollagen type Ⅲ (PⅢP) and their clinical significance in the patients with liver cirrhosis. **Methods** Serum NPY, HA and PⅢP levels in 66 patients with liver cirrhosis and 35 healthy controls were measured by radioimmunoassay (RIA). **Results** The serum NPY levels in the patients were significantly lower than those in the controls ($P < 0.01$), while the serum HA and PⅢP levels in the patients were significantly higher than those in the controls ($P < 0.01$). Serum NPY levels were negatively correlated with HA and PⅢP levels in the patients ($r = -0.968 6$, $-0.955 3$, $P < 0.01$). **Conclusion** Detecting serum NPY, HA and PⅢP levels has important significance to understand the disease condition and judge the prognosis of liver cirrhosis.

【Key words】 liver cirrhosis; neuropeptide Y; hyaluronic acid; procollagen type Ⅲ

神经肽 Y(NPY)是由 Tatemoto 等于 1982 年从猪脑中分离并提纯的含 36 个氨基酸残基的神经多肽,与肝脏疾病密切相关^[1]。透明质酸(HA)和前胶原蛋白 III(PⅢP)为诊断早期肝纤维化十分重要的检测指标,在临床上已得到广泛应用^[2],但国内尚少见同时研究肝硬化患者血清 NPY 与 HA、PⅢP 相关性的文献报道。本文对此进行了探讨,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 (1)患者组 66 例,男 46 例,女 20 例,年龄 34~68 岁,平均 46.5 岁,均为本院感染科经临床明确诊断的肝硬化患者(其中 34 例为无腹水组,32 例为伴有腹水组)。全部病例的诊断包括体征、B 超、CT 检查,部分病例经核磁共振(MRI)或肝穿活检证实。(2)健康对照组 35 例,男 25 例,女 10 例,年龄 28~67 岁,平均 44.1 岁,均为本院体检中心经体检合格的健康者,无心、肝、肺、肾等重要脏器疾患,肝、肾功能正常。

1.2 方法 血清 NPY、HA 和 PⅢP 水平检测采用放射免疫分析法。NPY 试剂盒来源于北方免疫试剂研究所;HA 和 PⅢP 试剂盒来源于上海放射免疫试剂公司。操作按厂家说明书进行。

1.3 统计学处理 所测数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示,组间比较采用 t 检验,相关分析采用直线回归方法。

2 结果

2.1 肝硬化组和健康对照组血清三项指标测定结果 见表 1。

2.2 血清 NPY 水平与 HA、PⅢP 水平的相关性 肝硬化患者血清 NPY 水平与 HA、PⅢP 水平呈明显负相关($r =$

$-0.968 6$ 、 $-0.955 3$, $P < 0.01$)(图 1、2)。

表 1 肝硬化组和健康对照组血清三项指标测定结果($\bar{x} \pm s$)

组别	n	NPY(pg/mL)	HA(ng/mL)	PⅢP(μ g/mL)
健康对照组	35	140.2 $\pm$ 41.4	50.4 $\pm$ 10.5	59.6 $\pm$ 22.2
肝硬化无腹水组	34	102.5 $\pm$ 16.5 Δ	172.8 $\pm$ 88.4 Δ	158.9 $\pm$ 101.2 Δ
肝硬化伴腹水组	32	55.6 $\pm$ 10.2 $\Delta\Delta$	442.9 $\pm$ 131.8 $\Delta\Delta$	239.8 $\pm$ 110.4 $\Delta\Delta$

注:与健康对照组比较, $\Delta P < 0.01$;与肝硬化无腹水组比较, $\Delta\Delta P < 0.01$ 。

图 1 肝硬化患者血清 NPY 与 HA 水平的相关性

图 2 肝硬化患者血清 NPY 与 PⅢP 水平的相关性

3 讨论

NPY 是一种生物活性多肽,属于缩血管多肽之一,它参与了多种疾病的病理过程,近年来颇受临床和科研工作者的关注^[3-5]。NPY 广泛分布于哺乳动物或人的神经系统及其他组织器官中,循环血液中也有一定量的分布。其主要来源有:(1)交感神经的释放,当交感神经兴奋性升高时,NPY 释放增加。(2)血小板内 NPY 的释放,当胶原刺激等因素引起血小板聚集继而使血小板活化时,可使 NPY 释放增多,最终使血浆中 NPY 水平升高。本文检测结果表明,肝硬化患者血清 NPY 水平明显低于健康对照组,差异有统计学意义($P < 0.01$),尤以肝硬化伴腹水组为甚。造成患者血中 NPY 水平降低的原因可能与以下因素有关:(1)由于血小板具有合成和分泌 NPY 的能力,而肝硬化时尤其是合并脾功能亢进时血小板减少,这可能是造成肝硬化患者血清 NPY 水平降低的重要原因。(2) NPY 主要分布于中枢神经系统,肝性脑病时由于中枢神经系统受抑制,可能导致 NPY 释放降低。(3) NPY 是体内主要的血管收缩因子,而肝硬化时由于患者循环系统多呈高排低阻状态,血管外阻力下降,这可能造成 NPY 减少。与此同时,患者的肾素-血管紧张素-醛固酮系统活性增强,引起体内钠水滞留。因此,血浆 NPY 水平的降低与肝硬化的血液流变学异常及水肿、腹水形成有关^[6]。

国内外文献一致认为,血清 HA 和 PⅢP 水平与肝组织炎症活动密切相关,并在一定程度上反映病情的轻重^[7-8]。本文检测结果表明,肝硬化患者血清 HA 和 PⅢP 水平均显著地高于健康对照组($P < 0.01$),且以肝硬化伴腹水组尤甚,这与文献报道结果一致。另外,本文还对血清 NPY 与 HA、PⅢP 水平进行了相关性分析,结果表明三者呈明显负相关($r = -0.4185, -0.5016, P < 0.01$)。

(上接第 2077 页)

介导体液免疫反应,二者量和比值的变化对机体免疫平衡有重要影响。IFN- γ 是 Th1 的标志性细胞因子,能激活巨噬细胞,促进其杀灭微生物,上调主要组织相容性复合物 II 类分子水平。Takahito 等^[6]在一项研究中发现,IFN- γ (-/-)大鼠在 SAP 过程中伴有更严重的中性粒细胞浸润,胰腺损伤更重,但在 SAP 诱导后 4 h 给予 IFN- γ 能显著减轻胰腺炎的病情。IL-4 是 Th2 的标志性细胞因子,但 Th2 产生的细胞因子还包括 IL-6、IL-10、IL-5 和 IL-13 等。已有研究证实,Th2 型细胞因子 IL-6 在 SAP 时有不同程度的过度生成,可反映急性胰腺炎的严重程度,IL-6 过度分泌可以损害正常的细胞和组织,其水平过高常提示疾病预后不良^[7-8]。如果能通过药物或其他方式改变 Th1/Th2 比值的极化,纠正其失衡状态,将对 SAP 的病情大有裨益,为治疗 SAP 提供一种新的方法和途径。

参考文献

- [1] Bhatia M, Wong FL, Cao Y, et al. Pathophysiology of acute pancreatitis[J]. Pancreatol, 2005, 5(2):132-144.
- [2] Ueda T, Takeyama Y, Yasuda T, et al. Functional alterations of splenocytes in severe acute pancreatitis[J]. J Surg Res, 2002, 102(2):161-168.
- [3] Ueda T, Takeyama Y, Yasuda T, et al. Significant eleva-

综上所述,检测肝硬化患者血清 NPY、HA 和 PⅢP 水平的变化,对了解病情、观察预后、探讨其发病机制等具有重要临床价值。

参考文献

- [1] Tatemoto K, Carlquist M, Muttu V. Neuropeptide Y—a novel brain peptide with structural similarities to peptide YY and pancreatic polypeptide [J]. Nature, 1982, 296(5858):659-660.
- [2] 程明亮,刘三都. 肝纤维化的基础与临床[M]. 北京:人民卫生出版社,1996.
- [3] 陈立刚,迟宝秦,孙艳. 神经肽 Y 的临床研究进展[J]. 吉林大学学报:医学版,2007,33(2):399-401.
- [4] 安洪真,梁堃,罗南兹. 不同肾脏疾病时 leptin 与 NPY 的水平变化[J]. 放射免疫学杂志,2008,21(4):293-294.
- [5] 刘宁,黄雯. 慢性肾衰竭瘦素及神经肽 Y 的变化及其对消化系统的影响[J]. 国际移植与血液净化杂志,2007,5(4):25-27.
- [6] 何浩明,王惠明,马达. 标记免疫分析与 PCR 在医学中的应用[M]. 合肥:安徽大学出版社,2002.
- [7] 张定凤. 肝纤维化非创伤性指标的综合性诊断[J]. 中华肝病杂志,2001,9(5):260-261.
- [8] 丁红兵,陈永鹏,冯筱榕,等. 慢性乙型肝炎纤维化分期与血清纤维化标志物的相关性分析[J]. 中华肝病杂志,2001,9(2):78-80.

(收稿日期:2011-03-08)

tion of serum interleukin-18 levels in patients with acute pancreatitis[J]. J Gastroenterol, 2006, 41(2):158-165.

- [4] Rau BM, Krüger CM, Hasel C, et al. Effects of immunosuppressive and immunostimulative treatment on pancreatic injury and mortality in severe acute experimental pancreatitis[J]. Pancreas, 2006, 33(2):174-183.
- [5] 吕云福. 现代胰腺外科学[M]. 北京:人民军医出版社,2003:126-134.
- [6] Takahito H, Yuko I, Akihiko K, et al. IFN-gamma protects cerulein-induced acute pancreatitis by repressing NF-kappa B activation[J]. J Immunol, 2007, 178(11):7385-7394.
- [7] Bhatia M, Brady M, Shokubi S, et al. Inflammatory mediators in acute pancreatitis[J]. J Pathol, 2000, 190(2):117-125.
- [8] Laser HG, Gross V, Scheibenbogen C, et al. Elevation of serum interleukin-6 concentration precedes acute phase response and reflects severity in acute pancreatitis[J]. Gastroenterology, 1991, 101(3):782-785.

(收稿日期:2011-05-24)