· 论 著 · DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2022.11.007

16S rRNA 在常见致病分枝杆菌菌种鉴定中的应用*

纪凌云^{1,2}, 李马超², 蒋毅², 赵秀芹², 万康林², 王琳琳³, 刘海灿^{2△}

1. 同济大学附属东方医院南院检验科, 上海 200120; 2. 中国疾病预防控制中心
传染病预防控制所/传染病预防控制国家重点实验室, 北京 102206;
3. 同济大学附属东方医院门诊护理部, 上海 200120

摘要:目的 通过分析 16S rRNA 在不同分枝杆菌中的异同, 探讨测序技术有关的实验和数据处理问题。**方法** 采用 Mega6.0 软件对 34 株非结核分枝杆菌分离株及美国国家生物技术信息中心(NCBI)现有的 55 株常见致病分枝杆菌和 1 株诺卡菌的 16S rRNA 序列进行比对分析, 并用 Maximum Likelihood 法构建进化树, 最后用 DNASTAR/MegAlign 程序计算种间及种内相似性。**结果** PCR 扩增后获得长度约为 1 500 bp 的目的片段, 与下载获得的 16S rRNA 序列进行比对分析并剪齐后保留 1 248 bp, 16S rRNA 可以将常见致病性分枝杆菌分为 18 群, 种间相似性为 91.5%~100.0%, 种内相似性为 99.0%~100.0%。**结论** 16S rRNA 种内保守性高且具有较好的种特异性, 除了龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌、鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌和胃分枝杆菌、溃疡分枝杆菌和海鱼分枝杆菌、人型分枝杆菌和牛型分枝杆菌不能分开外, 16S rRNA 可将常见致病性分枝杆菌各种分开, 可作为一种较好的鉴定分枝杆菌的方法。

关键词: 16S rRNA; 分枝杆菌; 鉴定

中图法分类号: R372

文献标志码: A

文章编号: 1672-9455(2022)11-1467-05

Application of 16S rRNA in identification of common pathogenic Mycobacteria*

Ji Lingyun^{1,2}, Li Machao², Jiang Yi², Zhao Xiuqin², Wan Kanglin², Wang Linlin², Liu Haican^{2△}

1. Department of Clinical Laboratory, Affiliated East Hospital South Yard, Tongji University, Shanghai 200120, China; 2. National Institute for Communicable Disease Control and Prevention Chinese Center for Disease Control and Prevention/State Key Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control, Beijing 102206, China; 3. Department of Nursing, Affiliated East Hospital, Tongji University, Shanghai 200120, China

Abstract: Objective To explore the experimental and data processing problems related to sequencing technology by analyzing the similarities and differences of 16S rRNA in different Mycobacteria. **Methods** The Mega6.0 software was used to conduct the comparative analysis on 16S rRNA sequence in 34 isolated strains of non-tuberculosis Mycobacterium, 55 existing strains of common pathogenic Mycobacteria and 1 strain of *Nocardia farcinica* in NCBI. The Maximum Likelihood method was used to construct the evolutionary tree, and the DNASTAR/MegAlign program was finally used to calculate the interspecific and intraspecific similarity. **Results** The 1 500 bp target fragment was obtained after PCR amplification, after cutting to the same length, 1 248 bp was retained, 16S rRNA could divide the common pathogenic Mycobacteria into 18 groups, the range of interspecific similarity was 91.5% to 100.0%, and the range of intraspecific similarity was 99.0% to 100.0%. **Conclusion** 16S rRNA has high intraspecific conservatism and good intraspecific specificity, which can well distinguish various kinds of the common pathogenic Mycobacteria, except for *Mycobacteria chelonae* and *Mycobacteria abscessus*, *Mycobacteria avium* and *Mycobacteria intracellulare*, *Mycobacteria kansasii* and *Mycobacteria gastri*, *Mycobacteria ulcerans* and *Mycobacteria marinum*, *Mycobacteria bovis* and *Mycobacteria tuberculosis*.

Key words: 16S rRNA; Mycobacteria; identification

* 基金项目: 上海市公共卫生体系建设三年行动计划(2020—2022 年)(GWV-10.1-XK04)。

作者简介: 纪凌云, 女, 技师, 主要从事医学检验研究。△ 通信作者, E-mail: liuhaican@icdc.cn。

非结核分枝杆菌 (NTM) 指除结核分枝杆菌复合群 (包括结核分枝杆菌、牛分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌) 和麻风分枝杆菌以外的所有其他分枝杆菌属, 该菌广泛存在于水、土壤和灰尘等自然环境中, 为条件致病菌, 至今已发现 150 余种, 大约有 50 种能引起人类疾病^[1]。目前研究者对已知分枝杆菌的 16S rRNA 基因已经全部测序, 通过基因比较分析, 发现分枝杆菌 16S rRNA 基因既含有属特异的保守序列, 又含有种特异性的高变区。以 16S rRNA 基因为靶基因, 采用 PCR 测序方法, 通过序列的分析可以鉴定分枝杆菌。本研究结合美国国家生物技术信息中心 (NCBI) 基因库现有的 55 株常见致病性分枝杆菌 16S rRNA 序列, 以及 28 株人源和 6 株牛源 NTM 分离株 16S rRNA 测序结果, 探讨 16S rRNA 序列在常见致病性分枝杆菌菌种鉴定中的价值, 现报道如下。

1 材料与方法

1.1 菌株来源 收集 2012—2015 年四川人源性 19 株 4 种、2014 年内蒙古牛源性 6 株 2 种、2005—2012 年福建人源性 6 株 2 种、2010 年甘肃人源性 2 株 1 种、2015 年北京人源性 1 株 1 种, 共计 34 株 NTM, 均为罗氏培养基培养阳性, 经噻吩-2-羧酸 (TCH)、对硝基苯甲酸 (PNB) 培养初步鉴定为 NTM, 再经多位点序列分析及保守基因 16S、16S-23S rRNA (ITS)、RNA 聚合酶的 β -亚基 (rpoB) 和热休克蛋白 65 (hsp65) 等的测序结果与 NCBI 序列库比对鉴定到种, 并由中国疾病预防控制中心传染病预防控制所结核室传代保存。具体信息见表 1。

表 1 临床菌株信息

菌株号	菌株	分离年份 (年)	分离地	宿主
ZGCDC2013153	堪萨斯分枝杆菌	2013	四川	人
ZGCDC2014024	堪萨斯分枝杆菌	2014	四川	人
ZGCDC2014095	堪萨斯分枝杆菌	2014	四川	人
ZGCDC2015046	堪萨斯分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2015264	堪萨斯分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2015252	堪萨斯分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2013142	胞内分枝杆菌	2013	四川	人
ZGCDC2014291	胞内分枝杆菌	2014	四川	人
ZGCDC2015011	胞内分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2015187	胞内分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2015296	胞内分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2013192	脓肿分枝杆菌	2013	四川	人
ZGCDC2013319	脓肿分枝杆菌	2013	四川	人

续表 1 临床菌株信息

菌株号	菌株	分离年份 (年)	分离地	宿主
ZGCDC2014086	脓肿分枝杆菌	2014	四川	人
ZGCDC2015279	脓肿分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2015348	脓肿分枝杆菌	2015	四川	人
ZGCDC2012196	鸟分枝杆菌	2012	四川	人
ZGCDC2014060	鸟分枝杆菌	2014	四川	人
ZGCDC2014135	鸟分枝杆菌	2014	四川	人
HHHTCDC20145S	鸟分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
HHHTCDC2014F20	偶发分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
HHHTCDC2014F90	偶发分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
HHHTCDC2014FJ	偶发分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
HHHTCDC2014G46	偶发分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
HHHTCDC2015Y28D	偶发分枝杆菌	2014	内蒙古	牛
FJ05522	偶发分枝杆菌	2005	福建	人
FJ05528	偶发分枝杆菌	2005	福建	人
FJ05529	偶发分枝杆菌	2005	福建	人
FJ10095	偶发分枝杆菌	2010	福建	人
FJ12060	偶发分枝杆菌	2012	福建	人
FJ12122	苏尔加分枝杆菌	2012	福建	人
GS10052	龟分枝杆菌	2010	甘肃	人
GS10054	龟分枝杆菌	2010	甘肃	人
BJ15002	瘰癧分枝杆菌	2015	北京	人

1.2 方法

1.2.1 细菌 DNA 制备 采用水煮法提取 DNA, 挑取 3~4 周龄新鲜菌落并用生理盐水洗脱菌体, 80 °C 灭菌 30 min, 离心收集菌体, 用 500 μ L TE 缓冲液重新悬菌, 沸水浴 15 min, 12 000 r/min 离心 3 min, 取上清液即为模板 DNA, -20 °C 保存备用。

1.2.2 16S rRNA 序列扩增 (1) 扩增体系: 反应体系总体积 25.0 μ L, 2 $\times$ Taq Master Mix 12.5 μ L, 10 μ mol/L 上下游引物各 1.0 μ L, 双蒸水 8.5 μ L, DNA 模板 2.0 μ L。为获得 34 株 NTM 的 16S rRNA 基因全序列, 采用正向引物 Fd1、反向引物 Rp2 进行扩增, 扩增长度约为 1 500 bp, 引物由北京天一辉远有限公司合成, 引物序列参照文献[2]。正向引物 Fd1: 5'-AGAGTTTGGATCATGGCTCAG-3'; 反向引物 Rp2: 5'-ACGGCTACCTTGTACGACTT-3'。将 PCR 产物送至北京天一辉远有限公司进行双向测序分析。(2) 扩增条件为 94 °C 预变性 10 min, 94 °C 变性 1 min, 58 °C 退火 1 min, 72 °C 延伸 1 min, 30 个循环, 最后 72 °C 延伸 10 min。

1.2.3 16S rRNA 序列下载 从 NCBI 上下载 1 324

bp 以上 23 种 55 株常见致病分枝杆菌及用来建外群的 1 株诺卡菌 16S rRNA 全长序列。

1.2.4 核苷酸序列分析 采用 PCR 扩增电泳的方法验证目的片段并将测得的序列输入 NCBI 数据库, 用局部相似性基本查询工具 BLAST 程序进行比对分析, 验证是否为所测菌的 16S rDNA 序列。

1.2.5 16S rRNA 进化树的建立及序列分析 将拼接好的 34 株 NTM 分离株 16S rRNA 序列和从 NCBI 上下载的 16S rRNA 序列共 90 条, 采用 Mega6.0 软件中的 MUSCLE 进行多序列比对, 参数保持默认值不变, 选择 Maximum Likelihood 法构建进化树, Bootstrap 法生成 1 000 个重复序列组。种间及种内相似性计算使用 DNASTAR/MegAlign 中的 Clustal W 方法完成。

2 结 果

2.1 NTM 分离株 16S rRNA 序列 PCR 扩增电泳结果 34 株 NTM 分离株均可扩增出 1 条约 1 500 bp 的条带, 与预期片段大小相符, 见图 1。测序结果大小为 1 345~1 362 bp, 与 NCBI 数据库进行比对后发现, 不同种的 16S rRNA 序列与 NCBI 数据库中现存序列相似性均在 99% 以上, 可见该片段为本实验所要研究的的目的片段。

2.2 分枝杆菌 16S rRNA 序列测定结果

2.2.1 验证目的片段 将所测定的 34 株 NTM 分离株的 16S rRNA 序列用 NCBI 的 BLAST 程序比对分析, 结果显示与分枝杆菌的相似性均达 99%, 说明扩增片段为目的基因。

注: M 为 DNA 标志物; 1~7 为部分 NTM 分离株 16S rRNA 序列 PCR 扩增电泳结果; N 为阴性对照。

图 1 部分 NTM 分离株 16S rRNA 序列 PCR 扩增电泳结果

2.2.2 分枝杆菌 16S rRNA 序列种间、种内相似性分析 将 34 条所测 NTM 16S rRNA 序列和 NCBI 中 55 条常见致病分枝杆菌 16S rRNA 序列导入 DNASTAR/MegAlign 软件采用 Clustal W 方法进行多序列比对, 以及种内及种间相似性分析。种内、种间两两比对后统计相似性范围, 结果显示, 种内相似

性为 99.0%~100.0%, 其中脓肿分枝杆菌、鸟分枝杆菌、龟分枝杆菌、偶发分枝杆菌、胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌、海鱼分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、苏尔加分枝杆菌、人型分枝杆菌种内相似性均可高达 100.0%, 种内相似性最小值出现在戈登分枝杆菌种内比较中, 为 99.0%, 提示 16S rRNA 序列的种内保守性很高。分枝杆菌种间相似性为 91.5%~100.0%, 其中部分人型分枝杆菌与牛型分枝杆菌、鸟分枝杆菌与胞内分枝杆菌、胃分枝杆菌与堪萨斯分枝杆菌的种间相似性可达 100.0%。其次, 海鱼分枝杆菌和溃疡分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌与苏尔加分枝杆菌、脓肿分枝杆菌与龟分枝杆菌表现出较高的种间相似性, 均在 99.4% 以上(分别为 99.8%、99.8%、99.9%)。蟾分枝杆菌、草分枝杆菌与其他分枝杆菌相比, 种间相似性普遍较低, 蟾分枝杆菌与其他分枝杆菌比较, 相似性为 91.5%~94.9%, 其中蟾分枝杆菌与龟分枝杆菌相似性仅为 91.5%。草分枝杆菌与其他分枝杆菌种间相似性为 92.6%~97.2%, 其中, 草分枝杆菌与蟾分枝杆菌相似性仅为 92.6%, 草分枝杆菌与耻垢分枝杆菌种间相似性较高, 为 97.2%。这提示通过 16S rRNA 序列难以有效区分同一复合体的不同分枝杆菌亚种, 但对于其他分枝杆菌种间能得到较好区分。

2.3 NTM 16S rRNA 系统进化分析结果 以 34 株临床株测序所得的 34 条 16S rRNA 序列和 55 条从 NCBI 下载的常见致病分枝杆菌 16S rRNA 序列, 并以诺卡菌作为外群, 构建系统进化树, 见图 2。除了龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌、鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌和胃分枝杆菌、溃疡分枝杆菌和海鱼分枝杆菌、人型分枝杆菌和牛型分枝杆菌不能分开外, 使用 16S rRNA 可以很好地将常见致病分枝杆菌各种分开, 共分为 18 群。

2.4 NTM 不同种 16S rRNA 碱基变异分析 选取本研究所测 34 株 NTM 临床分离株 16S rRNA 序列和从 NCBI 上下载的所有常见致病性分枝杆菌的 16S rRNA 序列(若分枝杆菌种内相似性为 100%, 则合并为 1 株进行分析)共 90 条, 采用 Clustal W 分析剪齐后获得的序列大小为 1 248 bp。分析易变区, 以 *M. abscessus*_ATCC19977 作为变异位点的参考序列, 分枝杆菌 16S rRNA 整体保守性较高, 存在易变区有 7 个, 分别在 40~90、306~352、414~487、706~741、871~890、983~1 017、1 136~1 138 碱基位点。具体碱基变异分析见表 2。

图 2 16S rRNA 聚类结果

表 2 碱基变异分析

菌株	碱基改变位置	碱基改变
蟾分枝杆菌	73~74	GT 插入
	79~80	CG 插入
	517	A→T
	699~700	CT 缺失
	1 014	G→A
	1 231	C→T
人型和牛型分枝杆菌	73~74	GC 插入
	1 150	T→A
日内瓦分枝杆菌	472~474	CAC→GGG
	712	G→A
	833	A→G
	1 049	G→A
瘰疬分枝杆菌	115	T→A
浅黄分枝杆菌	133	C→T
	306	A→G
草分枝杆菌	1 023	T→C
溃疡分枝杆菌	1 112	A→G
不产色分枝杆菌	1 127	G→C
	1 136	T→G
	1 157	C→T
龟和脓肿分枝杆菌	761	C→T
	768	G→A
	1 157	C→T

3 讨 论

基于 16S rRNA 基因的分子生物学检测技术对于 NTM 感染的诊断和进化分析是非常重要的,尤其对于那些不能培养的或者已经被杀死的菌株^[3]。

16S rRNA 5'端存在 A 区和 B 区,含有针对分枝杆菌的高度变异的核酸序列,使用特异靶基因 16S rRNA 进行序列分析,已经被广泛接受作为鉴定分枝杆菌的“金标准”。A 区序列包含大多数分枝杆菌的种特异序列,通常用作鉴定序列,而后发现的 B 区序列亦为许多菌种共有,也被证实可用于个别菌种鉴定^[4-5]。由于 NTM 感染后患者可以具有与结核病相似的临床表现,但在治疗和预防上与结核病有明显不同,不同种的 NTM 对药物的敏感性也不同,因此选择正确和及时的 NTM 鉴定方法对该病患者的治疗和流行病学研究是迫在眉睫的^[1,6]。

近年来,基于 16S rRNA 建立的鉴定分枝杆菌的方法有很多,如:基于小段 16S rRNA 高变异区的焦磷酸测序技术,该技术主要用于分枝杆菌种内鉴定,可与 16S rRNA 基因的桑格测序法相比较,据报道,该方法与其他鉴定方法具有较高的符合率^[7]。另外基于 16S rRNA 寡核苷酸的基因芯片技术也已经被应用,已在鼻腔、上消化道、肠道样品中检测到分枝杆菌的 DNA^[8]。此外,16S rRNA 基因有一段 138 bp 片段的高度可变区,可用于鉴别已知及新型的分枝杆菌,且其鉴定 NTM 快速、准确,鉴定种多达 40 余种,如今已广泛应用于分枝杆菌的鉴定。本次实验中 16S rRNA 目的片段长度约为 1 500 bp,测序所得片段长度在 1 340 bp 以上,比对剪齐后为 1 248 bp,因此覆盖 16S rRNA 的信息较全面。值得注意的是,本实验使用的 34 株 NTM 来自 5 个地域,且不同地域菌种分布有差异,同一菌种分布于同一地域,无法对

NTM 的 16S rRNA 序列进行地域特征的分析。

本研究利用分离株及从 NCBI 数据库中下载的 16S rRNA 序列,系统探讨 16S rRNA 序列在常见致病分枝杆菌菌种鉴定中的应用价值。从系统进化树中可以发现,除了龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌、鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌和胃分枝杆菌、溃疡分枝杆菌和海鱼分枝杆菌、人型分枝杆菌和牛型分枝杆菌等几个关系较近的菌种不能分开外,使用全长 16S rRNA 序列可以很好地将 13 种常见致病性分枝杆菌各种分开。通过种间相似性水平分析可以发现,草分枝杆菌、蟾分枝杆菌与其他分枝杆菌差异较大,而部分人型分枝杆菌与牛型分枝杆菌、鸟分枝杆菌与胞内分枝杆菌、胃分枝杆菌与堪萨斯分枝杆菌的种间相似性最高可达 100.0%,其次为脓肿分枝杆菌与龟分枝杆菌(99.9%)、海鱼分枝杆菌和溃疡分枝杆菌(99.8%)、玛尔摩分枝杆菌与苏尔加分枝杆菌(99.8%)。这几种由于相似性极高,很难用 16S rRNA 鉴别开来,这与之前的相关研究结果相符^[9]。但是 16S rRNA 可以将偶发分枝杆菌、日内瓦分枝杆菌、浅黄分枝杆菌、戈登分枝杆菌、嗜血分枝杆菌、不产色分枝杆菌、草分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、耻垢分枝杆菌、土分枝杆菌、蟾分枝杆菌很好地鉴别开来,因此可以作为一种较好的鉴定分枝杆菌的方法。而通过种内相似性比较,发现其中脓肿分枝杆菌、鸟分枝杆菌、龟分枝杆菌、偶发分枝杆菌、胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌、海鱼分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、苏尔加分枝杆菌、人型分枝杆菌种内相似性最高可达 100.0%,可见分枝杆菌 16S rRNA 的种内保守性高。

通过 NTM 不同种 16S rRNA 碱基变异的分析,发现存在点突变、缺失突变、插入突变等变异类型。蟾分枝杆菌的特异碱基变异较多,存在 2 处连续 2 个碱基的插入,3 个单碱基的突变,1 处连续 2 个碱基的缺失。日内瓦分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、浅黄分枝杆菌、草分枝杆菌、溃疡分枝杆菌、不产色分枝杆菌均存在特异的碱基变异。此外,人型分枝杆菌和牛型分枝杆菌、龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌作为复合群分别存在特异的碱基变异。根据分枝杆菌特异的碱基变异,构建荧光定量 PCR 等高灵敏度的分子生物学检测方法,对于分枝杆菌检测及流行病学调查具有重要意义。虽然 PCR 产物直接测序技术存在一定的错配率,但本实验采用双向测序的方法进行测序,且经北京天一辉远有限公司对测序峰图分析并拼接序列,可有效减少错配事件发生。

虽然在鉴定分枝杆菌方面有一个健全的 16S rRNA 库,且每种分枝杆菌有一个特异和稳定的

16S rRNA 序列,但是人们仍不能确定有多少个碱基不同才能区别一个种。据报道,如果 16S rRNA 不同的碱基数小于 5 个,或者它们的差异性小于 1.5%,则可以认为是相同的种^[10]。可见 16S rRNA 鉴定方法也存在一定的弊端,基于 hsp65 的限制性片段长度多态性分析(PRA)方法以及 ITS 的序列分析均能将 16S rRNA 不能区分的脓肿分枝杆菌和龟分枝杆菌、胃分枝杆菌和堪萨斯分枝杆菌鉴别开来。因此,联合应用其他分子生物学鉴定方法,会取得更好的效果。

参考文献

- [1] KOH W J. Nontuberculous Mycobacteria: overview[J]. *Microbiol Spectr*, 2017, 5(1): 653-661.
- [2] ADÉKAMBI T, DRANCOURT M. Dissection of phylogenetic relationships among 19 rapidly growing Mycobacterium species by 16S rRNA, hsp65, sodA, recA and rpoB gene sequencing[J]. *Int J Syst Evol Microbiol*, 2004, 54(6): 2095-2105.
- [3] HOZA A S, MFINANGA S G M, RODLOFF A C, et al. Increased isolation of nontuberculous Mycobacteria among TB suspects in Northeastern, Tanzania: public health and diagnostic implications for control programmes [J]. *Bmc Res Notes*, 2016, 9(1): 109.
- [4] PARK H E, KIM S, SHIM S, et al. 16S and 23S rRNA gene mutation independent multidrug resistance of nontuberculous Mycobacteria isolated from South Korean Soil[J]. *Microorganisms*, 2020, 8(8): 1114.
- [5] KIM S H, SHIN J H. Identification of nontuberculous Mycobacteria using multilocus sequence analysis of 16S rRNA, hsp65, and rpoB[J]. *J Clin Lab Anal*, 2017, 32(1): e22184.
- [6] WU M L, AZIZ D B, DARTOIS V, et al. NTM drug discovery: status, gaps and the way forward[J]. *Drug Discov Today*, 2018, 23(8): 1502-1519.
- [7] KIM J U, CHA C H, PARK S H. Direct identification of Mycobacteria from liquid media using a triplex real-time PCR coupled with pyrosequencing method[J]. *J Microbiol Methods*, 2015, 119: 83-86.
- [8] MACOVEI L, MCCAFFERTY J, CHEN T, et al. The hidden mycobacteriome of the human healthy oral cavity and upper respiratory tract[J]. *J Oral Microbiol*, 2015, 7(1): 26094.
- [9] REN N, GAO G, SUN Y, et al. MicroRNA signatures from multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis[J]. *Molec Med Rep*, 2015, 12(5): 651-657.
- [10] 刘驰, 李家宝, 芮俊鹏, 等. 16S rRNA 基因在微生物生态学中的应用[J]. *生态学报*, 2015, 35(9): 20.